


Mois de sensibilisation à l'infertilité

**Fibrome utérin
& Infertilité...**


Ce qu'il faut savoir



Le fibrome utérin du point de vue de la fertilité...

Selon les **RARES** études existantes,

seulement **2 à 3 %**
de femmes atteintes de fibromes
sont **infertiles**.



Fibrome utérin & santé reproductive

Ce qu'il faut savoir


Fragilisation de l'utérus

L'ensemble de l'appareil reproducteur féminin peut être mis à mal par les fibromes.

L'utérus, réceptacle de la vie, peut être fragilisé par la présence d'un ou de plusieurs fibromes logés dans son sein.

Compression des trompes

Par la compression exercée sur les trompes, les fibromes peuvent empêcher leur perméabilité et occasionner une infertilité mécanique ou tubaire.



Fibrome utérin & santé reproductive

Ce qu'il faut savoir

Traitements

Outre les risques directement imputables aux fibromes, certains traitements peuvent aussi occasionner une infertilité mécanique ou tubaire.

Interventions chirurgicales répétées


Suite à de multiples interventions chirurgicales, l'utérus peut être fragilisé par des cicatrices (il est alors appelé multi-cicatriciel).

Cela peut entraîner une infertilité ou des complications pendant la grossesse ou l'accouchement.

Attention aux fibromes intra-cavitaires

Egalement appelés “**fibromes sous-muqueux**”, les fibromes **Figo 0, 1 et 2**, situés à l'intérieur de la cavité utérine, peuvent affecter la fertilité et être responsables de fausses couches à répétitions et d'accouchements prématurés.

Il est fortement recommandé de les traiter pour optimiser les chances de conception et de grossesse à terme.



Synéchies et adhérences post-opératoires

Definition des Synéchies :

Ce terme désigne des adhérences anormales des parois de l'utérus. Les synéchies et les adhérences-post opératoires peuvent se former après une intervention chirurgicale.

Synéchies et infertilité

En fonction de leur sévérité et de leur localisation, les synéchies peuvent occasionner une infertilité partielle ou totale en empêchant la migration des spermatozoïdes ou en rendant impossible l'implantation de l'embryon.

Synéchies et adhérences post-opératoires

→ **1ère cause d'infertilité secondaire chez les femmes multi-opérées**

L'utilisation de patchs ou de gel anti-adhérenciel, peut permettre de réduire de 50 % les risques de synéchies et d'adhérences post-opératoires.

Ce sont des précautions nécessaires qui doivent être prises par les équipes médicales lors de chaque opération pour limiter les risques d'infertilité.

Étiez-vous au courant de l'impact des fibromes sur l'infertilité ?



**Si ce post vous a plu ou été utile,
commentez-le et partager-le !**